

SÉDATION INTRAVEINEUSE

LE CONFORT ULTIME EN VUE D'UNE CHIRURGIE
BUCCALE



PROBUCA CLINIQUE SPÉCIALISÉE
IMPLANTOLOGIE + CHIRURGIE BUCCALE ET MAXILLO-FACIALE

216, BOUL. LABELLE, ROSEMÈRE (QUÉBEC) J7A 2H4

T. 450 543-4343

T. 888 658-0022

INFO@PROBUCA.CA
PROBUCA.CA

Information générale relative à la sédation intraveineuse

La sédation consciente intraveineuse a pour but de diminuer la crainte que certains patients peuvent avoir face à leur chirurgie. Les médicaments utilisés causent entre autres de la somnolence et de l'amnésie. Il ne s'agit pas d'une anesthésie générale donc il est possible que certaine personne reste avec un vague souvenir de l'intervention. La sédation intraveineuse offre le meilleur confort qui soit en vue d'une chirurgie buccale. Elle est proposée à nore clinique depuis de très nombreuses années.

Règles à respecter en lien avec la sédation

- Vous devez être à jeun, c'est-à-dire ne rien manger et ne rien boire 6 heures avant d'arriver à votre rendez-vous. Évitez svp les repas riches en gras la veille car ils prennent plus de temps à digérer;
- Seuls les médicaments prescrits par votre médecin ou votre dentiste peuvent être pris avec une petite quantité d'eau. (Exemple : médication donnée pour la pression);
- Si vous souffrez de diabète, veuillez svp nous en informer;
- Une personne adulte et responsable doit vous accompagner pour le retour à la maison suite à votre chirurgie avec sédation;
- Une personne adulte et responsable devrait rester avec vous pour les 18 heures suivant la sédation, cette période pourrait être plus longue notamment si vous continuez à ressentir de la somnolence;
- Vous ne pouvez pas conduire un véhicule motorisé ou faire des activités demandant de la vigilance pour les 24 heures suivant la sédation. Cette période pourrait être plus longue notamment si vous continuez à ressentir de la somnolence;
- Il est interdit de consommer de l'alcool ou toute autre drogue pour les 48 heures avant ou suivant la sédation. Cette période pourrait être plus longue notamment si vous continuez à ressentir de la somnolence;
- Vous devez nous informer de tout changement récent de votre état de santé, incluant la prise de nouveau médicament et/ou nouvelle allergie;
- Il est recommandé de porter des vêtements confortables particulièrement un chandail ou une chemise à manche courte le jour de votre chirurgie.

Effets secondaires possibles suite à une sédation

- Nausées et vomissements;
- Réaction allergique relative à la médication utilisée;
- Œdème/enflure ou ecchymose (bleu) de la peau au site de ponction de l'avant-bras;
- Apnée : La sédation utilisée peut abaisser occasionnellement votre taux d'oxygène dans le sang en raison d'une respiration peu profonde. L'utilisation d'oxygène supplémentaire peut ainsi être nécessaire pendant l'intervention chirurgicale;
- Infection ou inflammation (phlébite) au site de ponction de l'avant-bras. Cette complication extrêmement rare se manifeste par une rougeur, une enflure et une douleur au site de ponction.

Pendant l'intervention chirurgicale

La prise de vos signes vitaux sera effectuée régulièrement au début, pendant et après l'intervention. Nous mettons en place un soluté intraveineux à travers lequel nous administrons les différents médicaments. Vous serez facilement éveillable mais votre état de conscience sera diminué causé par l'administration des médicaments. Il est possible de vous installer de l'oxygène pendant l'intervention si besoin est.

Après l'intervention chirurgicale

Vous demeurez dans la salle pendant 30 à 45 minutes afin que les effets de la sédation s'estompent et que vous rencontriez les critères de départ. C'est l'infirmière qui assure cette supervision et qui révisera les conseils post-opératoires concernant la sédation avec vous et votre accompagnateur.

POUR TOUTE QUESTION EN LIEN AVEC LA SÉDATION INTRAVEINEUSE, VEUILLEZ SVP COMMUNIQUER AVEC NOTRE SECRÉTARIAT CLINIQUE AU 450-543-4343.